

В средней и северной части России обитает обыкновенный серый сорокопут. Эта крупная певчая птица обитает в верховых болотах и в северном болотистом редколесье. Гораздо реже ее можно встретить в низине болота, на заболоченных лугах, в кустарниках по речным поймам. Во время кочевки и зимовки птицу можно встретить в местах обитания человека.

Обыкновенный серый сорокопут представляет собой довольно крупную птицу с большой головой, удлиненным хвостом, коротенькими крылышками. Птица в длину может достигать 38см, а крылья в размахе составляют 39см. В верхней части туловища сорокопут имеет светло-серое оперение. Восточная популяция птиц имеет буроватый оттенок оперения. Подбородок птицы, щеки и надбровная часть — белые. Крыло птицы черное с белым участком. Низ тела белесый, грудь более темная. Самки отличаются наличие на груди сероватого рисунка. Клюв черный, мощный с загнутым надклювьем. Полет серого сорокопута волнообразный.

Размер птицы обоих полов одинаков, поэтому в естественной среде обитания их довольно сложно отличить. Обычная трель сорокопута спокойная. Но если на территории обитания появляется опасность, то обыкновенный серый сорокопут издает резкий продолжительный свист.

Обыкновенный серый сорокопут

Автор: Administrator

25.11.2012 00:00 - Обновлено 11.07.2013 09:24

Размножение птиц происходит в годовалом возрасте. Создает гнезда на кустах ивняка и деревьях. Минимальная высота гнездования 2 метра, а максимальная — 18 метров. В одной кладке 5-7 яиц. Насиживание продолжается 14-16 дней. После появления на свет птенцы находятся в гнезде до 20 суток. Еще продолжительное время родители докармливают своих повзрослевших птенцов. Питаются серые сорокопуты мелкими позвоночными и крупными беспозвоночными.